

# 症例 ライブラリー

この無痛分娩依頼に対して、  
どうすればいいですか？

これまで無痛分娩は保険適用外とされ、費用は自己負担であった。しかし、東京都では一定の条件を満たした 2025 年 10 月 1 日以降の出産に対して助成が開始された。最近増加傾向にある無痛分娩は、これが契機となってさらに増加し、あまり無痛分娩にかかわってこなかった麻酔科医が無痛分娩に関わる機会も増えるだろう。今月の症例ライブラリーは、「脊髄幹麻酔自体には習熟しているが、無痛分娩はそれほど…」という麻酔科医が無痛分娩希望の妊婦の診察時に「どうすればいい？」と悩んでしまうような症例を挙げた。手術麻酔と異なり、脊髄幹麻酔の実施に懸念があるならば全身麻酔を適用すればよい、とシンプルにはいかないのが無痛分娩である。類似症例に遭遇した際の参考になれば幸いである。

岡山大学学術研究院医歯薬学域 麻酔・蘇生学

谷 真規子

## ◆ まとめ… 無痛分娩にも 麻酔のプロフェッショナルとして臨む

1160

## ◆ ITP 合併妊婦… 無痛分娩をできないかもしれないと 聞いて、とても不安です…

35 歳の女性。身長 160 cm、体重 62 kg（非妊時 54 kg）。1 妊 0 産。1 年前に免疫性血小板減少症（immune thrombocytopenia (ITP)）と診断された。妊娠初期…

1156

## ◆ 脊髄幹麻酔による神経障害の既往がある妊婦

32 歳の女性。身長 158 cm、体重 60 kg（非妊時 56 kg）。初産婦。妊娠 34 週。無痛分娩希望のため、産科麻酔外来を受診した。その際の間診で、29 歳時、他院で脊…

1152

## ◆ 脊椎術後妊婦の無痛分娩

31 歳の女性。身長 163 cm、体重 69.5 kg。妊娠 30 週。妊娠経過は順調である。19 歳時に思春期特異性側弯症（adolescent idiopathic scoliosis (AIS)）に対し…

1146

## ◆ フォンタン術後の妊婦

35 歳の女性。1 妊 0 産。身長 150 cm、体重 52 kg（非妊時 45 kg）。心臓病歴… 右側相同、僧帽弁閉鎖、両大血管右室起始、肺動脈弁狭窄、総肺静脈還流異常…

1140

## ◆ Osler-Weber-Rendu 症候群を合併している妊婦

28 歳の女性。身長 162 cm、体重 64 kg。初産婦。産婦人科から、現在妊娠 32 週で無痛分娩を希望しているとの連絡があった。依頼文には「妊娠に伴う合併症はな…

1136

## 各項のキーワード

以下は掲載順ではありません。  
それぞれの症例で何か起きたのか考えながら読んでください

読用

- ダブルクラッシュ現象 / 馬尾症候群 / 一過性神経症状 (TNS) / 局所麻酔薬神経毒性
- 脊椎手術後 / 穿刺困難 / 特異性思春期側弯症 / CSEA
- Osler-Weber-Rendu 症候群 / 遺伝性出血性末梢血管拡張症 (HHT) / 脊髄動静脈奇形 / 妊婦 MRI / 脊髄幹麻酔
- 妊娠性血小板減少症 / 脊髄幹手技 / 血小板減少 / 血小板輸血 / 硬膜外血腫
- Fontan 循環 / 侵襲的モニタリング / 努責

正体

23<sup>シ</sup> → 139<sup>シ</sup>